

ДЕЛИРИЙ: что не нужно делать



НЕ ОТНОСИТЕСЬ
К ДЕЛИРИЮ КАК
К ДОБРОКАЧЕСТ-
ВЕННОМУ
СОСТОЯНИЮ

НЕ ДАВАЙТЕ
ПАЦИЕНТУ
БРОДИТЬ
НОЧЬЮ

НЕ ФИКСИРУЙТЕ
ПАЦИЕНТА



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
КАТЕТЕРЫ / ЗОНДЫ
БЕЗ КРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ



НЕ ПРОВОДИТЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЕЗ КРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ,
ОСОБЕННО
НОЧЬЮ

НЕ ПОВЫШАЙТЕ
ГОЛОС
НА ПАЦИЕНТА



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
АНТИПСИХОТИКИ,
ПОКА ДРУГИЕ
МЕРЫ НЕ ПРИНЯТЫ

ДЕЛИРИЙ: ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

1. АКТИВНО ВЫЯВЛЯЙТЕ ДЕЛИРИЙ



- Боль
- Запор
- Инфекция
- Полипрагмазия
- Изменение обстановки
- Оперативное вмешательство
- Дегидратация
- Иммобилизация
- Алкоголь

Делирий -
используйте
шкалу
оценки
спутанности
сознания

3. ОРИЕНТИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА



- ЧАСЫ, КАЛЕНДАРЬ



- ОЧКИ



- СЛУХОВОЙ АППАРАТ

2. ПРИВЛЕКАЙТЕ РОДСТВЕННИКОВ



- Прислушайтесь к семье / друзьям / сиделке, когда они жалуются на спутанность сознания пациента
- Уточните у родственников, какие лекарства принимает пациент
- Разрешите визиты родственников, семейные фото
- Минимизируйте переводы из отделения в отделение

4. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ



- Выявляйте и отменяйте препарат, который может провоцировать делирий

5. СОН

- Создайте условия для сна пациента

